

## 附件 2

# 品种非处方药说明书范本

## 保妇康凝胶说明书

请仔细阅读说明书并按说明使用或在药师指导下购买和使用

[药品名称]保妇康凝胶

通用名称:

汉语拼音:

[成份]

[性状]

[功能主治]行气破瘀，生肌止痛。用于湿热瘀滞所致的带下病，症见带下量多、色黄、时有阴部瘙痒；霉菌性阴道炎见上述证候者。

[规格]每支装 4 克

[用法用量]洗净外阴部，将凝胶挤入阴道深部；或在医生指导下用药。每晚 1 支。

[不良反应]监测数据显示，本品可见以下不良反应报告：用药部位灼烧感、瘙痒、皮疹、红肿、疼痛、不适，阴道出血，皮疹，恶心，腹痛，过敏反应等。

**[禁忌]**

1. 孕妇禁用。
2. 对本品及所含成份过敏者禁用。

**[注意事项]**

1. 本品为阴道给药，禁止内服。
2. 忌辛辣、生冷、油腻食物。
3. 治疗期间忌房事，配偶如有感染应同时治疗。
4. 未婚妇女不宜使用；已婚妇女月经期及阴道局部有破损者不宜使用。
5. 外阴白色病变、糖尿病所致的瘙痒不宜使用。
6. 带下伴血性分泌物，或伴有尿频、尿急、尿痛者，应去医院就诊。
7. 哺乳期妇女、绝经后患者，应在医生指导下使用。
8. 注意卫生，防止重复感染。用药前应先用温开水清洗外阴；给药时应洗净双手。
9. 用药部位如有烧灼感等不适时应停药，严重者应向医生咨询。
10. 用药 7 天症状无缓解，应去医院就诊。
11. 过敏体质者慎用。
12. 本品性状发生改变时禁止使用。
13. 请将本品放在儿童不能接触的地方。
14. 如正在使用其他药品，使用本品前请咨询医师或药师。

[药物相互作用] 如与其他药物同时使用可能会发生药物相互作用，详情请咨询医师或药师。

[贮藏]

[包装]

[有效期]

[执行标准]

[批准文号]

[说明书修订日期]

[药品上市许可持有人]

名 称:

注册地址:

邮政编码:

电话号码:

传真号码:

网 址:

[生产企业]

企业名称:

生产地址:

如有问题可与药品上市许可持有人联系。

# 调经养颜颗粒说明书

请仔细阅读说明书并按说明使用或在药师指导下购买和使用

**孕妇禁用**

[药品名称]调经养颜颗粒

通用名称:

汉语拼音:

[成份]

[性状]

[功能主治]彝医:

中医: 补血益气, 调经养颜。用于妇女月经不调及其引起的痛经、面色淡暗或有暗斑。

[规格]每袋装4克

[用法用量]开水冲服。一次1~2袋, 一日3次。

[不良反应]监测数据显示, 调经养颜制剂可见头晕、头痛、失眠、恶心、腹泻、皮疹、瘙痒等不良反应报告。

**[禁忌]**

**1.孕妇禁用。**

**2.对本品及所含成份过敏者禁用。**

**[注意事项]**

**1.服药期间忌食生冷食物。**

**2.感冒时不宜服用。患有其他疾病者, 应在医师指导下服用。**

**3.青春期少女、更年期妇女应在医师指导下服用。**

**4.如有生育要求者, 使用前应咨询医师, 并应在医师指导下服用。**

**5.平素月经正常, 突然出现月经过少, 或经期错后, 或阴道不规则出血者应去医院就诊。**

**6.治疗痛经, 宜在经前3~5天开始服药, 连服1周。**

**7.服药后痛经不减轻, 或重度痛经者, 应到医院诊治。**

**8.服药2周症状无缓解, 应去医院就诊。**

**9.过敏体质者慎用。**

**10.本品性状发生改变时禁止使用。**

**11.请将本品放在儿童不能接触的地方。**

**12.如正在使用其他药品, 使用本品前请咨询医师或药师。**

[药物相互作用] 如与其他药物同时使用可能会发生药物相互作用, 详情请咨询医师或药师。

[贮藏]

[包装]

[有效期]

[执行标准]

[批准文号]

[说明书修订日期]

[药品上市许可持有人]

名称:

注册地址:

邮政编码:

电话号码:

传真号码:

网 址:

[生产企业]

企业名称:

生产地址:

如有问题可与药品上市许可持有人联系。